

Cotoneaster racemiflorus (Desf.) Schltdl.

الاسم العلمي Cotoneaster racemiflorus (Desf.) Schneid.

الفصيلة: ROSACEAE

الاسم المحلي: سفرجلية

التوصيف:

شجيرة أو شجرة صغيرة فروعها بنية محمرة مغبرة عندها تكون فتية. الأوراق دائرية سطحها العلوي أخضر ووسطها السفلي ابيض لبادي. البتلات بيضاء شبه دائرية أفقية. السبلات مثلثة. الثمرة حمراء شبه كروية.

المميزات:

لا يرد النوع في فلورة هوتيرد ويرد انتشاره في سورية حسب كيو

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة ينمو على السفوح الصخرية الكلسية والمتحولة في غابات الصنوبر والبلوط . محب للضوء، متحمل للظل، مقاوم للصقيع، بشكل عام غير متطلب للتربة ولذا يعيش على التربة الصخرية والكلسية.

موطن:

أشهر الإزهار:

حياة:

الانتهاء الجغرافي:

إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية غابوي record New plant Forest

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ •
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>